

# شدید دمہ / گلے میں گھر گھراہٹ کے لیے ذاتی ایکشن پلان

بچوں اور ایک سال سے زیادہ کے بچوں میں۔ دمہ کو اچھی طرح کنٹرول رکھنے کے لئے مشورہ

December 2016  
Kent, Surrey & Sussex  
Version

ساؤتھ ایسٹ کلینیکل نیٹ ورکس  
چلڈرن اینڈ یونگ پیپل



مشترکہ  
حفظ  
مریضان

جب بھی آپ اپنے جی پی سرجری یا ہسپتال میں ڈاکٹر یا نرس کے پاس جاتے ہیں تو اس پلان کو بھی ساتھ رکھیں یہ پلان دمہ یا سانس کے مریضوں کے لئے ہے۔ آپ کا ڈاکٹر / جی پی یا نرس اس کو پر کریں گے اور آپ کے دمہ کو کنٹرول میں رکھنے کے لئے مختلف ادویات دیں گے۔ یہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ کیسے آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ دمہ یا سانس بڑھ رہا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ابتدائی اقدامات کر کے - شدید حملوں سے عموماً بچا جا سکتا ہے۔

## برائے مہربانی درج ذیل تفصیلات کو پرنٹ کر لیں (اور یا لیبل منسلک کر لیں):

لیبل منسلک کریں

\_\_\_\_\_ مریض کا نام

\_\_\_\_\_ تاریخ پیدائش

\_\_\_\_\_ جی پی سرجری

\_\_\_\_\_ ٹیلی فون

\_\_\_\_\_ GP / دمہ نرس

\_\_\_\_\_ اور / یا ہسپتال کا ڈاکٹر / دمہ کی نرس

\_\_\_\_\_ مکمل ہونے کی تاریخ


\_\_\_\_\_ ماہر کا نام

\_\_\_\_\_ ماہر کے دستخط


\_\_\_\_\_ جائزے کی تاریخ

## دمہ انہیلر کے ساتھ اسپیسر کے استعمال کے لئے مستند تکنیک۔ (پریشرانڈ میٹرڈ ڈوز آلہ)

ماسک کے ساتھ مناسب جسامت کا اسپیسر منتخب کریں (اگر بچہ چار سال سے بڑا ہے تو ماؤتھ پیس منتخب کریں تا کہ سانس نہ رکے اور تکنیک اچھی رہے)۔



- 1 انہیلر کو اچھی طرح بلائیں اور ڈھکن ہٹائیں۔
  - 2 اسپیسر کے اختتام پر انہیلر کو سوراخ میں لگا دیں۔
  - 3 بچے کے چہرے پر ماسک لگائیں یا ان کے منہ میں ماؤتھ پیس رکھیں اس طرح کہ اچھی طرح ہوا بند ہو جائے۔
  - 4 انہیلر کو اچھی طرح دبائیں اور ہر خوراک کے درمیان بچہ کو 5 آہستہ گہرے سانس لینے کے لئے کہیں۔
  - 5 انہیلر کو ہٹائیں اور دو کش کے درمیان اسے بلائیں۔
- بعد والی دوا کے لئے 2 - 6 تک کے مراحل کو دہرائیں۔



## آپ کا دمہ / سانس کیسا ہے؟ (ٹریفک لائٹ مشورہ)

علامات	آپ کا لائحہ عمل:
بلکا	اگلے دن کی ملاقات کے لئے GP سے فون کے ذریعے وقت طے کر لیں۔ اگر آپ کا اپنے GP سے رابطہ نہیں ہوتا تو متبادل طریقہ یہ ہے کہ 24 گھنٹہ مشورہ کے لئے 111 پر کال کریں۔
نرمیابہ	4 گھنٹہ بعد 2-10 پفس دوا کے دیں فوری طور پر اپنے GP سے رابطہ کر کے اسی دن ملاقات کے لئے وقت طے کر لیں۔ گر آپ کا اپنے GP سے رابطہ نہیں ہوتا تو متبادل طریقہ یہ ہے کہ 24 گھنٹہ مشورہ کے لئے 111 پر کال کریں۔
شدید	دوا کے 10 پفس دین اور ہر 10 منٹ بعد دہرائیں۔ اگر آپ کے پاس گھر پر دستیاب ہے تو منہ کے ذریعے پریڈنیسولون دینا شروع کر دیں۔ فوری مدد کے لئے (یا موبائل سے 112 پر) کال کریں۔
زنگی کو خطرہ	ایمبولینس کے آنے تک دوا کے 10 پفس دین اور ہر 10 منٹ بعد دہرائیں۔ اگر آپ کے پاس گھر پر دستیاب ہے تو منہ کے ذریعے پریڈنیسولون دینا شروع کر دیں۔ فوری مدد کے لئے (یا موبائل سے 112 پر) کال کریں۔



اسکول نرس /  
ہیلتھ وزیٹر  
(یہاں پر نمبر نوٹ کریں)

111 NHS  
111 ٹل کریں  
(ہفتے میں 24 گھنٹہ  
7 دن دستیاب)

GP سرجری  
(یہاں پر نمبر نوٹ کریں)

آن لائن مشورے کے لئے: NHS چوائس: [www.nhs.uk](http://www.nhs.uk)  
(ہفتے میں 24 گھنٹہ 7 دن دستیاب)  
فیملی انفارمیشن سروس: تمام علاقوں میں خاندانوں کو مفید معلومات فراہم کرنے کے لئے مقامی کونسلز کی قائم کردہ آن لائن سروس ہے۔

اگر آپ کو زبان میں مدد یا ترجمے کی ضرورت ہو تو برائے مہربانی اپنے متعلقہ عملے کے رکن کو مطلع کریں۔  
رہائے دینے یا مزید معلومات بشمول یہ کہ اس دستاویز کی مزید نقول کیسے حاصل کی جائے (برائے مہربانی حوالہ دیں: AA1) ہمارے پاس ساؤتھ ایسٹ کلینیکل نیٹ ورکس ایریا (کینٹ، سرے اور سسیکس) کی طرف سے ان سوالات کے لئے ایک ہی میل باکس ہے۔ برائے مہربانی ای میل کریں [CWSCCG.cypSECPATHWAYS@NHS.net](mailto:CWSCCG.cypSECPATHWAYS@NHS.net)

# شدید دمہ / گلے میں گھرگھراہٹ کے لیے ذاتی ایکشن پلان

بچوں اور 1 سال تک کے بچوں میں۔ دمہ کو اچھی طرح کنٹرول رکھنے کے لئے مشورہ

December 2016  
Kent, Surrey & Sussex  
Version



مشترکہ  
خطا  
مریضان

یہ دمہ / سانس کی گھرگھراہٹ کے لیے ذاتی لائحہ عمل پرمبنی پلان ہے

مکمل شدہ حصے صرف درج بالا بچے یا نوجوان پر لاگو ہوتے ہیں۔

علاج

آپ کا دمہ قابل کنٹرول ہے اگر:

- آپ کے اندر کوئی علامت نہیں۔ دن یا رات کے دوران (بشمول سانس، کھانسی، سانس پھولنا، سینے میں جکڑن)۔ آپ ان علامات کے بغیر اپنی روزمرہ کی سرگرمیاں سرانجام دے سکتے ہیں
- آپ یا آپ کے بچے کو کسی سکون اور انہیلر (سالیوٹامول) کی ضرورت نہیں ہوتی۔

انہیلر کا رنگ:

سکون اور علاج:

اسپیسر:

انہیلر آلے کا نام:

یہ کیا کرتا ہے؟ سانس کے دوران ریلیوزز آپ کو پرسکون کرتی ہے اور ہوا کی نالیوں کو کھولتی ہے۔ ضرورت کے وقت استعمال کریں۔ 4 گھنٹے بعد لیا جا سکتا ہے اور اگر علامات برقرار رہیں تو دوبارہ دہرایا جا سکتا ہے۔ 4-6 گھنٹے کی خوراک میں دوا 4-6 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے۔ اس وقت تک جبکہ آپ کے بچے کو شدید دمہ کا حملہ درپیش ہے تو پھر 10 گھنٹے سے زیادہ استعمال نہیں کیا جائے۔

اگر آپ کو 10 گھنٹے سے زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو اپنے ڈاکٹر یا دمہ کی نرس سے ملاقات کریں۔

مزید مشورہ: سردیاں یا ایسی چیزیں جو کھانسی، سانس میں آواز یا سانس کے پھولنے کا باعث بنتی ہیں، ان کے شروع ہونے سے پہلے انہیلر کا استعمال شروع کر دیں۔ ہمیشہ اسپیسر کے ذریعے استعمال کریں۔

اگر آپ کو 1 ماہ میں 1 سے زیادہ انہیلر آلے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اپنے ڈاکٹر یا دمہ کی نرس سے ملاقات کریں۔

انہیلر کا رنگ:

تدارکی علاج

اسپیسر

انہیلر آلے کا نام

یہ کیا کرتا ہے؟ تدارکی انہیلر اسٹیرائڈز ہوتے ہیں جو کہ سوجن کو روکتے ہیں اور آپ کو سوجن اور سوجن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس لئے اگر علامات نہ بھی ہوں تو بھی انہیلر باقاعدگی سے لینا ہوتا ہے۔

مزیں مشورہ: نفس یعنی کش دن میں دوبار باقاعدگی سے لیں اگر چہ علامات نہ بھی ہوں۔ اس انہیلر کو صبح اور شام میں استعمال کریں۔ چونکہ یہ دوا اسٹیرائڈ ہے، استعمال کے بعد اپنے دانتوں کو صاف کریں اور کلی کریں۔ جب تک ڈاکٹر یا نرس مشورہ نہ دیں۔ صحتیاب ہونے کے بعد بھی تدارکی علاج کو بند مت کریں۔ جب تک کہا نہ جائے، ہمیشہ اسپیسر کے ذریعے استعمال کریں۔ ہمیشہ اپنے پاس ایک زائد انہیلر رکھیں اور جب یہ شروع کر دیں تو نیا طلب کریں۔

اضافی ادویات / علاج:

پیک فلو (6 سال سے بڑے بچوں کے لئے) - اگر علامات شدید ہوں تو نیلا انہیلر (سکون اور علاج) دینے سے پہلے صبح اور شام میں 3 پیک فلو پیمائشیں لینا بہترین ہے

نام/ خوراک/ مقدار/ تعداد:

نام/ خوراک/ تعداد

منہ کے ذریعے اسٹیرائڈز (پریٹینسلون)۔ کب استعمال کرنی ہے اور خوراک:

(100%) منٹ/

منٹ/

سب سے بہتر پیک فلو

قابل اندازہ پیک فلو

آپ کا دمہ ہے قابو ہے اگر آپ کا پیک فلو نیچے ہے:

(80% کا بہترین یا اندازہ پیک فلو)

دمہ / سانس کے ساتھ اپنی اور اپنے بچے کی دیکھ بھال کرنا

- ہمیشہ اپنے بچے کے ریلیوز (نیلا) انہیلر اور اسپیسر تک رسائی یقینی بنائیں۔
- اپنے بچے کے اسکول میں انہیلر (اسپیسر کے ساتھ) / اسپیسر کے بغیر) رکھنا یاد رکھیں اور یہ زائد المیعاد نہ ہو۔

• گھر سے باہر اپنے یا اپنے بچے کے ساتھ انہیلر لینا یاد رکھیں۔

• ہمیشہ اپنے بچے کے لئے تجویز کردہ انہیلر آلہ استعمال کریں۔

• یاد رکھیں کہ ایمرجنسی میں ریلیوز کو درست طریقہ سے اسپیسر کے ساتھ ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔

• طے شدہ معائنہ پر جانا یاد رکھیں۔



میرے عوامل ہیں:

- کھانسی اور سردی
- سگریٹ کا دھواں
- ورزش
- سرد موسم
- پالتو جانور کی کھال یا پر
- گردوغیل
- زردی
- لودگی
- الحساسیت
- پھپھوندی اور سپورز
- دیگر

منی ہے: برٹش تھوریکس سوسائٹی (BTS) / سکوتش انٹر کالجیٹ گائیڈ لائنز نیٹ ورک (SIGN)۔ گائیڈ لائن 141۔ برٹش گائیڈ لائن ایسٹھما مینجمنٹ (منی 2008 نظر ثانی شدہ اکتوبر 2014)

انکوائری رپورٹ، ہیلتھ کیئر کوالٹی ایمر وومنٹ پارٹنر شپ / رائل کالج آف فزیشن (RCP) منی 2014، اس پاتھوے کا نیشنل ریویو آف ایسٹھما ڈیٹیس (NRAD) کے کلینیکل لیڈ، ڈاکٹر مارک لیوی نے نیشنل ہیلتھ ایسٹھما ایسوسی ایشن کے اشتراک کے ساتھ جازہ لیا ہے۔