

گھر پر اور / یا ہسپتال سے رخصت ہونے کے بعد اپنے بچے کی دیکھ بھال کرنا

مفید پتے



ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ہسپتال:

رائل الیگزینڈرا چلڈرن ہسپتال
ایسٹرن روڈ، برائٹن BN2 5BE

پرنسس رائل ہسپتال

لیوس روڈ، ہیورڈز، ہیٹ 4EX 16 RH

سرے اینڈ سسیکس ہیلتھ کیئر NHS ٹرسٹ مشرقی سرے ہسپتال

کینیڈا ایونیو، ریڈیل، سرے RH1 5RH

ویسٹرن سسیکس ہسپتال NHS فاؤنڈیشن ٹرسٹ بشمول:

سینٹ رچرڈز ہسپتال

سپٹافیلڈ لین، کائیچیٹر PO 19 6SE

وردنگ ہسپتال

لنڈھرسٹ روڈ، وردنگ BN11 2DH

مانٹر انجریز یونٹس (MIU) یا ارجنٹ کیئر سینٹرز

باگنور ریجس وار میموریل ہسپتال

مانٹر انجریز یونٹس

شرپنے روڈ، باگنور ریجس، PO 22 9PP

کھلا ہے صبح 9 - شام 5، پیر - جمعہ (بینک کی چھٹیاں نکال کر)

کراولے ارجنٹ ٹریٹمنٹ سینٹر - Crawley ہسپتال

ویسٹ گرین ڈرائیو، کراولے RH11 7DH

ہفتے میں 7 دن 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے

بارشمن مانٹر انجریز یونٹ - بارشمن ہسپتال

برسٹ روڈ، بارشمن RH12 2DR

اوپن 9am-5pm، پیر سے جمعہ (بنک کی چھٹیاں نکال کر)

کونین وکٹوریہ ہسپتال مانٹر انجریز یونٹ (MIU)، ایسٹ گرینز ٹیڈ

Holtye روڈ، ایسٹ گرینز ٹیڈ RH 19 3DZ

کھلا ہے ہفتے میں 7 دن صبح 8 سے رات 10

ویسٹ سسیکس - فیملی معلوماتی سروس

ٹیلی فون نمبر: 01243 777807

www.westsussex.gov.uk/family

اس دستاویز کی مزید نقول، رائے اور معلومات کے لئے ہمیں ای


میل کریں:

چائیچیٹر / وردنگ ایریا: contactus.coastal@nhs.net

کراولے ایریا: CCCG.contactus-crawleyccg@nhs.net

بارشمن / مڈ سسیکس ایریا:

HSCCG.contactus-horshamandmidsussexccg@nhs.net



بچوں اور نوجوان

لوگوں میں سر کی چوٹ

والدین اور کیئررز کے لئے مشورہ

بچے / نوجوان شخص کا نام

مشورہ دیا گیا

چوٹ کی جگہ

دسمبر 2016
تازہ ترین ورژن

چوٹ کی قسم

تاریخ

وقت

- کسی زخم کو نل کے پانی سے ساف کرنا
- اگر متاثرہ جگہ پر سوچن ہو یا خون نکل رہا ہو، 10-5 منٹس کے لئے دبائیں، اگر خون بہنا جاری رہتا ہے تو مزید دبائیں اور طبی مدد حاصل کریں۔
- اگر درد ہے تو پیرا سیٹامول یا آئیو بروفن دیں۔
- درست مقدار اور شکل کے لئے ہمیشہ تیار کرنے والے کی ہدایات پر عمل کریں۔
- اگلے 2-3 دن تک اپنے بچوں کا باریک بینی سے مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ آیا وہ معمول کے مطابق برتاؤ کر رہے ہیں اور حسب معمول آپ کو جواب دیتے ہیں۔
- اپنے بچے کو سونے کی اجازت دے دیں لیکن ان کا باقاعدگی سے مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ وہ چھونے پر کس طرح کا ردعمل ظاہر کرتے ہیں نیز بستر میں سوتے وقت ان کی پوزیشن کیا ہے۔
- اپنے بچے کو بہت زیادہ آرام کرنے دیں اور یہ یقینی بنائیں کہ اگلے 2-3 دن تک یا جب تک علامات ٹھیک نہ ہو جائیں، وہ سخت محنت طلب کام سے گریز کریں۔
- آپ کے بچے کو سر پر چوٹ لگنے کے بعد کم از کم 3 ہفتوں تک ڈاکٹر سے بات کرنے بغیر فٹ بال وغیرہ جیسے کھیل نہیں کھیلنے چاہئے۔
- آپ اپنے بچے کو بہتر جانتے ہیں۔ اگر آپ فکر مند ہیں تو مزید مشورہ لیں۔

حد سے زیادہ پریشان نہ ہوں، سر پر چوٹ لگنے کے بعد درج ذیل چیزیں متوقع ہیں اور 2 ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہیں:

- وقفے وقفے سے سر میں درد ہونا خاص طور پر ٹی وی اور کمپیوٹر گیم دیکھتے ہوئے
- اپنا کھانا چھوڑ دینا اور بیمار محسوس کرنا (قے کے بغیر)
- تھکن اور سونے میں مشکل
- مختصر دورانیے کا چڑچڑا پن، تنک مزاجی اور توجہ مرکوز نہ کر پانا
- اگر یہ علامات دیر تک برقرار رہتی ہیں تو آپ کو طبی مشورہ لینا چاہئے۔


سر کی چوٹ کے متعلق والدین اور کیئررز کے لیے مشورہ

ایسے بچے جن کے سر پر گومز / چوٹ ہو ان کی بہترین دیکھ بھال کے لئے یہ پمفلٹ آگاہی فراہم کرتا ہے

سر کے زخموں پر بہت کم ٹانگے لگانے جاتے ہیں اور طبی ماہر عام طور پر انہیں جوڑ دیتے ہیں۔ یہ ماہر انگریزیونٹس یا ارجنٹ ٹریٹمنٹ سینٹرز میں کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ جی پی پریکٹسز چھوٹی چوٹوں کے لئے خدمات پیش کرتے ہیں۔ صفحہ کے دوسری طرف مقامی سروس تلاش کریں۔

برائے مہربانی مدد کے لئے ”گھر پر اپنے بچے کی دیکھ بھال“ کامشورہ سیکشن (صفحے کے دوسری طرف) اور نیچے دیا گیا ٹریفک لائٹ مشورہ استعمال کریں بہت سے بچوں کی درج ذیل سبب رہنمائی کے مطابق دیکھ بھال کی جا سکتی ہے خاص طور پر اگر وہ چوکنے ہوں اور آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں۔ یہ یقین کرنے کے لئے کہ وہ آپ کے ساتھ حسب معمول برتاؤ کر رہے ہیں اس لئے اگلے 2-3 دن تک بچہ پر نظر رکھنا ضروری ہے۔

ٹریفک روشنی مشورہ:



سبز: کم خطرہ

اگر آپ کا بچہ:

• فوراً رویا (سر پر چوٹ لگنے کے بعد) لیکن تھوڑی دیر بعد معمول کے مطابق برتاؤ کرے

• چوکنا ہے اور آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے

• بے ہوش نہیں ہوا / ”غش نہیں کھایا“

• ان کے سر پر تھوڑی سی ٹھیس، سوجن یا چھوٹا زخم ہو

عمل: اگر درج بالا پرپورا اترتا ہے تو گھر میں معاملات نپٹائیں۔ صفحہ کی دوسری طرف موجود مشورہ پر عمل کریں یا اگر آپ د متفکر ہیں تو اپنے جی پی سے رابطہ کریں جب سرجری کھلی ہو اور یا پھر 111 پر کال کریں جب آپ کے جی پی سرجری بند ہو۔

پیلا: درمیانی خطرہ

اگر آپ کا بچہ:

• ایک یا دو بار قے کرتا ہے

• مسلسل سر میں درد ہے

• چڑچڑا ہوا ہے اور رویہ تبدیل شدہ ہے
خاص طور پر 5 سال سے چھوٹی عمر کے بچوں میں

• نشہ یا شراب کے زیر اثر ہو

• زیادہ نقصان پہنچا ہے اور طبی توجہ کی ضرورت ہے

لانچ عمل: اگر ان علامات میں سے کوئی ایک ہے تو اپنے بچے کو نزدیکی ہسپتال ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں لے جائیں۔

سرخ: زیادہ خطرہ

اگر آپ کا بچہ:

• اگر آپ کا بچہ 1 سال سے چھوٹا ہے اور اسے خراش، سوجن اور > 5 سینٹی میٹر سے زیادہ زخم آیا ہے
• تیز رفتار سڑک پر ٹریفک حادثے سے چوٹ لگی ہے یا 1 میٹر اونچائی سے گرا ہے یا تیز رفتار چیز سے ٹکر لگی ہے یا ڈرائیونگ حادثے میں ملوث ہے

• کسی بھی وقت بے ہوش ہو جاتا ہے
• نیند میں ہے اور آپ اسے جگا نہیں سکتے
• اچانک دورہ پڑتا ہے
• گردن میں درد ہے
• جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کو بولنے اور سمجھنے میں مشکل پیش آنا
• بازوؤں اور ٹانگوں میں کمزوری ہے اور اپنا توازن نہیں رکھ پاتا
• حادثے کے وقت اور اس سے پہلے کے واقعات یاد نہیں رکھ سکتا
• چوٹ کے بعد سے ناک، کان یا دونوں سے صاف یا خونی مواد کا قطرہ قطرہ بہنا
• 3 یا زائد بار قے ہونا

عمل: 999 پر فون کریں

(یا موبائل سے 112 پر کال کریں)

اگر ان میں سے کوئی علامت موجود ہے تو ایمبولینس کے لئے۔